

فرم ثبت انتشارات وزارت جهاد کشاورزی

در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

عنوان: دست‌نامه کاشت، داشت و برداشت بادمجان (*Solanum melongena* L.)

نویسنده: محمود باقری

مترجم:

در صورتی که اثر ترجمه باشد، لطفا عنوان و مشخصات کامل ماخذ اصلی را مرقوم فرمایید

گرد آورنده:

ناظر:

ویراستاران: دکتر جهانگیر عباس کوهپایگانی، مهندس ماهیار عابدی

چاپ: اول

ویرایش: اول

محل نشر: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

نام ناشر: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۴۸

تیراژ: ۱۰ نسخه

زبان اصلی: فارسی

لطفا موضوع کتاب یا نشریه خود را در ۵۰ کلمه مرقوم فرمایید

بادمجان یکی از سبزیجات مهم خانواده Solanaceae می‌باشد. ایران سومین کشور تولید کننده بادمجان در دنیا است. در این دست‌نامه علاوه بر معرفی این محصول و ارائه آمار تولید آن در ایران و جهان، به جنبه های مختلف کاشت، داشت و برداشت بادمجان بر اساس آخرین یافته‌های تحقیقاتی و روش‌های نوین مورد استفاده پرداخته است.

☐ نشریه ادواری

☒ نشریه

☐ کتاب

نوع:

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
بخش تحقیقات سبزی صیفی و حبوبات آبی

دست نامه
کاشت، داشت و برداشت
بادمجان
Solanum melongena L.



پژوهش و نگارش
محمود باقری

شماره ثبت: ۷۱۳۶/۲۴۴/۲۰

مورخه: ۹۴/۵/۱۲

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	مقدمه
۲	مشخصات گیاه شناسی
۴	شرایط آب وهوایی
۶	خاک
۶	کود
۸	آماده سازی مزرعه
۱۰	طرز تهیه خزانه تولید نشاء
۱۰	اهمیت تولید نشاء
۱۲	تجهیزات آبیاری در خزانه و گلخانه
۱۲	نوردهی در خزانه و گلخانه
۱۲	سیستم تولید نشاء در شرایط گلخانه‌ای
۱۳	ظروف کاشت
۱۵	خصوصیات بذر
۱۶	انتقال نشاء
۲۵	نکاتی که باید برای انتقال نشاء مدنظر قرار گیرد
۲۶	قیم زنی وخاک دهی پای بوته ها
۲۶	هرس
۲۷	مالچ گذاری
۲۷	آبیاری
۲۸	علف های هرز
۳۰	بیماری ها
۳۶	آفات
۴۱	برداشت
۴۵	منابع

بادمجان (Eggplant)، $2n=2x=24$ ، با نام علمی *Solanum melongena* L. یکی از سبزیجات مهم خانواده solanaceae می باشد. مجموع تولید بادمجان دنیا حدود ۴۵ میلیون تن است. چین با ۵۸٪ (۲۹ میلیون تن)، هند با ۱۲ میلیون تن و جمهوری اسلامی ایران با ۱/۳ میلیون تن رتبه های اول تا سوم تولید دنیا را در اختیار دارند (FAO, 2012). متوسط عملکرد بادمجان کشور ۳۱/۶ تن در هکتار است. استان های مهم تولیدکننده بادمجان کشور به ترتیب عبارتند از: خوزستان، هرمزگان، تهران، فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، بوشهر و منطقه جیرفت و کهنوج (جدول ۱). مرکز اولیه تنوع بادمجان، هند و مرکز ثانویه آن چین می باشد. ایران نیز در کمربند مناطق دارای تنوع از نظر بادمجان قرار گرفته است و توده های بومی این محصول در ایران وجود دارند. شمال آفریقا نیز جزو مناطقی است که خویشاوندان وحشی بادمجان به وفور در آن یافت می شوند (FAO, 2005).

بادمجان منبع بسیارخوبی از ویتامین ها و مواد معدنی است و از لحاظ ارزش غذایی کل با گوجه فرنگی قابل مقایسه می باشد. ۱۰۰ گرم بادمجان دارای ۲۴ کیلو کالری انرژی، ۱/۱ گرم پروتئین، ۰/۲ گرم چربی، ۱۱ میلی گرم کلسیم، ۲۵ میلی گرم فسفر، ۰/۴ میلی گرم آهن، ۶۳۰ واحد بین المللی ویتامین آ، ۰/۰۴ میلی گرم تیامین، ۰/۰۷ میلی گرم ریوفلاوین، ۰/۰۴ میلی گرم نیاسین و ۱۲۰ میلی گرم اسید اسکوربیک است. علاوه بر ویتامین ها و املاح یادشده، بادمجان دارای فیتونوترینت هایی است که خاصیت آنتی اکسیدانی فوق العاده ای دارند. اجزای فنولیکی دارای خاصیت ضدسرطانی، ضد کلسترول بد خون و ضد ویروسی می باشد. اهمیت بادمجان به علت طعم و مزه، قابلیت خوب حمل و نقل و شرایط ویژه کنسرو کردن است. بادمجان در تهیه غذاهای مختلف، همچنین انواع ترشیا کاربرد دارد. ریشه بادمجان برای درمان آسم به کار می رود. در برگ بادمجان موادی وجود دارد که باعث ترشح بزاق می گردد. همچنین از برگ آن در معالجه بیماری برونشیت، آسم و بیماری های دستگاه مجاری ادراری استفاده می شود.

جدول ۱- سطح زیر کشت، تولید و عملکرد بادمجان کشور (وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۹۱)

استان	سطح زیر کشت (هکتار)	تولید (تن)	عملکرد (تن در هکتار)
آذربایجان شرقی	۴۸۶	۹۳۸۰	۱۹/۳
آذربایجان غربی	۲۸	۲۹۴	۱۰/۵
اصفهان	۴۵۶	۱۳۸۶۲	۳۰/۴
ایلام	۲۰۵	۳۱۱۶	۱۵/۲
بوشهر	۷۵۸	۱۷۵۱۰	۲۳/۱
تهران	۳۹۴۸	۲۱۱۶۱۳	۵۳/۶
خراسان جنوبی	۱۴۹	۲۰۸۶	۱۴
خراسان رضوی	۱۴۳۸	۲۷۴۶۶	۱۹/۱
خراسان شمالی	۶۰	۱۲۷۸	۲۱/۳
خوزستان	۱۰۲۸۰	۳۰۶۳۴۴	۲۹/۸
زنجان	۳۰	۳۸۷	۱۲/۹
سمنان	۳۴۹	۵۹۶۸	۱۷/۱
سیستان و بلوچستان	۱۵۰۸	۲۷۴۴۵	۱۸/۲
فارس	۲۷۸۴	۱۴۳۳۷۶	۵۱/۵
کردستان	۴۸	۵۸۶	۱۲/۲
کرمان	۳۵	۶۰۲	۱۷/۲
کرمانشاه	۷۸	۱۲۵۶	۱۶/۱
کهگیلویه و بویراحمد	۴۰	۷۸۸	۱۹/۷
گلستان	۳۴۰	۶۵۲۸	۱۹/۲
گیلان	۳۹۰	۳۹۷۸	۱۰/۲
لرستان	۱۳۵	۲۴۰۳	۱۷/۸
مازندران	۴۴۵	۵۹۶۳	۱۳/۴
مرکزی	۴۵	۱۰۰۸	۲۲/۴
هرمزگان	۱۰۰۵۰	۲۷۴۳۶۵	۲۷/۳
همدان	۲۵	۵۷۵	۲۳
یزد	۴۸۵	۱۷۷۰۳	۳۶/۵
جیرفت و کهنوج	۶۳۵	۱۳۶۵۲	۲۱/۵
جمع	۳۵۲۳۰	۱۰۹۹۵۳۲	۳۱/۲

مشخصات گیاه شناسی:

ارتفاع بادمجان بین ۰/۵ تا ۱/۵ متر می‌باشد. ریشه آن سطحی، منشعب و قوی است. ساقه آن نیمه خشبی، سبزرنگ و دارای شاخه‌های فرعی گسترده می‌باشد. برگها ساده، کنگره‌دار، سبز روشن و مانند سایر گیاهان این خانواده کرکدار می‌باشند. گلها به صورت منفرد و یا درخوشه‌های دو یا چندتایی ظاهر می‌شوند. وقتی گلها به صورت منفرد باشند میزان ریزش آنها ۸۰ درصد کمتر از حالتی است که به صورت خوشه‌ای ظاهر شوند. گلها به اندازه ۳ تا ۵ سانتیمتر با دمگل مشخص، دارای ۵ کاسبرگ، ۵ گلبرگ به هم پیوسته به رنگ بنفش و سفید و ۵ پرچم زرد رنگ که مادگی را کاملاً احاطه کرده می‌باشند. گلها ۴۰ تا ۵۰ روز پس از نشاکاری ظاهر می‌شوند. باز شدن گل‌ها و پخش شدن گرده‌ها معمولاً بین ساعات ۶ تا ۱۱ صبح تحت تأثیر روشنائی، دما و رطوبت منطقه روی می‌دهد و با مشاهده و تجربه مشخص می‌گردد. بادمجان فاقد نیاز ویژه به طول روز جهت گلدهی است. بادمجان به طور معمول گیاهی با خودگرده‌افشانی بالاست و میزان دگرگشتی آن بستگی به ژنوتیپ، محل و میزان فعالیت حشرات دارد. میزان دگرگشتی در مرکز جهانی سبزیجات (AVRDC) بین صفر تا ۸/۲ درصد گزارش شده است. رام میزان دگرگشتی بادمجان را بین ۰/۷ تا ۲۹ درصد گزارش کرده است. میزان دگرگشتی در ارقام هندی بیشتر از ارقام چینی است (Ram, 1999).

میوه بادمجان از نوع سته یعنی نوعی میوه گوشتی است که دانه‌ها در داخل آن قرار می‌گیرند. کاسبرگ‌ها با میوه رشد می‌کنند و اغلب دارای خارهای زیادی هستند که در موقع برداشت محصول مشکلاتی را به همراه دارد. میوه‌های بادمجان در دامنه وسیعی از نظر شکل و رنگ می‌باشند. میوه‌ها در ارقام مختلف به رنگ‌های سیاه، ارغوانی، سبز، سفید، ابلق و رنگ‌های بینابین دیده می‌شوند (شکل ۲). از نظر شکل میوه نیز تنوع بالایی در بادمجان وجود دارد و ارقام مختلفی از باریک و دراز

تا کاملاً گرد در بادمجان مشاهده می شود. بذر زرد رنگ و دارای فرورفتگی کوچک است. قطر بذر ۲ تا ۴ میلی متر و ضخامت آن نیم تا یک میلیمتر است (پیوست، ۱۳۸۱).



شکل ۱-انواع میوه در بادمجان

شرایط آب وهوایی:

بادمجان بومی نواحی گرم بوده و در مقابل سرما حساس است (دمای کمتر از ۱۶ درجه سانتیگراد خسارت به بارمی آورد). برای تولید بادمجان، یک فصل رشد طولانی حدود ۱۲۰ روز نیاز است. بهترین رشد بادمجان در دمای ۲۱ تا ۲۹ درجه سانتیگراد اتفاق می افتد. دما و رطوبت بالا نیز عملکرد را کاهش می دهد. بادمجان می تواند خشکی و غرقابی را تحمل کند ولی دوره های طولانی غرقاب خاک باعث شیوع پاتوژنهای فساد ریشه می شود. بادمجان را از لحاظ نیاز نوری جزو گیاهان خنثی طبقه بندی می کنند ولیکن برای رشد و نمو مطلوب نیاز به گرما و نور کافی دارد. نورضعیف در ایام زمستان در گلخانه ها، بدشکل شدن میوه و افتادن گل و غنچه را باعث می شود. برای تشکیل مناسب گلها شدت نور بیش از ۱۰ کیلو لوکس نیاز است و در عین حال میزان گرمای داخل گلخانه نباید پائین تر از ۲۰ درجه سانتیگراد باشد. کاهش گرمای هوا و به ویژه گرمای خاک (کمتر از ۱۸ درجه سانتیگراد) نیز اغلب اختلالاتی مثل افتادن گل و غنچه را در پی دارد. اگر هدف تولید بذر باشد، دمای روزانه ۳۲-۲۵ و دمای شبانه ۲۷-۲۱ درجه سانتیگراد مناسب است (دانشور، ۱۳۷۹ و چن و دیگران، ۲۰۰۲).

استان	تقویم زمانی کاشت										تقویم زمانی برداشت									
	فرودین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فرودین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان
آذربایجان شرقی																				
آذربایجان غربی																				
اردبیل																				
اصفهان																				
ایلام																				
بوشهر																				
تهران																				
خراسان رضوی																				
خوزستان																				
زنجان																				
سمنان																				
سیستان و بلوچستان																				
فارس																				
قزوین																				
قم																				
کردستان																				
کرمان																				
کرمانشاه																				
کهگیلویه و بویراحمد																				
گلستان																				
گیلان																				
لرستان																				
مازندران																				
هرمزگان																				
همدان																				
چهارمحال و بختیاری																				

شکل ۲- تقویم زمانی کاشت و برداشت بادمجان در مناطق مختلف کشور

خاک:

بادمجان برای رشد مناسب احتیاج به حاصلخیزی خاک و تغذیه کافی دارد. بادمجان می‌تواند در تمامی خاکهای سبک شنی تا سنگین رسی رشد نماید. خاک لوم شنی برای زمانی که زودرسی مورد نظر است ایده‌آل می‌باشد. خاک‌های سنگین برای عملکردهای طولانی‌تر و تأخیری توصیه می‌گردد. برای رشد مناسب بادمجان PH ۵/۶-۶ مناسب می‌باشد. ضمناً از کشت بادمجان در مزارعی که قبلاً گیاهان خانواده Solanaceae (گوجه فرنگی، سیب زمینی، فلفل و بادمجان) کشت شده است بایستی پرهیز شود (چن، ۲۰۰۱).

کود:

بادمجان یک محصول با طول دوره رشد نسبتاً طولانی است و از جمله سبزیجاتی است که مواد غذایی زیادی از زمین جذب می‌کند. بدین منظور می‌بایست از کودهای آلی و شیمیایی قبل از کشت و همچنین از کودهای شیمیایی به صورت سرک پس از کاشت استفاده گردد. بدین منظور می‌توان در حین آماده سازی زمین ۳۰ تا ۴۰ تن در هکتار کود دامی پوسیده و یا ۱۰ تن در هکتار کمپوست و یا ۳ تن در هکتار کود مرغی را با خاک مزرعه مخلوط نمود. البته اگر زمین مزرعه شنی بوده و یا مزرعه از نظر مواد غذایی ضعیف باشد، می‌بایست این مقادیر را بالاتر در نظر گرفت. استفاده از کودهای شیمیایی به صورت مجزا و یا به صورت کود کامل باید در برنامه آماده کردن زمین قرار گیرد. مصرف کودهای شیمیائی می‌بایست بر اساس آزمون خاک باشد. در صورت کمبود منیزیم در خاک می‌بایست از آهک استفاده گردد. کاربرد آهک اگر ۳ تا ۴ ماه قبل از نشاکاری در خاک توزیع و تثبیت گردد بسیار مؤثرتر از مصرف دیر هنگام آن خواهد بود. به صورت کلی و در صورتی که امکان آزمون خاک وجود نداشته باشد عناصر نیتروژن، فسفر و پتاس به ترتیب به نسبت ۲۰۰، ۱۰۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار توصیه می‌گردد. نیمی از نیتروژن، تمامی فسفر و تمامی پتاس قبل از انتقال نشا و باقیمانده نیتروژن بسته به شرایط خاک در ۲ تا ۳ مرحله، ۳۰ تا ۴۵ روز پس از نشاکاری مصرف گردد. در آمریکا کودهای شیمیایی کامل را به میزان ۸۰۰ الی ۱۱۰۰ کیلوگرم در هکتار قبل از آماده سازی زمین، در خاک پخش می‌کنند (چن و دیگران، ۲۰۰۲).

- فسفر و پتاسیم: جدول ۲ میزان توصیه شده مصرف فسفر و پتاس بر اساس طبقه‌بندی حاصلخیزی خاک با توجه به آزمون خاک می باشد. داده ها بر اساس کیلوگرم در هکتار می باشد (داربی، ۱۹۹۰).
فسفر توصیه شده همزمان با نشاکاری یا کمی قبل از آن به کار برده می شود. توصیه می شود که محلولی از کود و آب تهیه گردد و به میزان لازم و متناسب پای هر نشاء ریخته گردد. پتاسیم را به صورت نواری و به فاصله ۵ تا ۸ سانتیمتر از نشاء و ۵ تا ۸ سانتیمتر زیر ناحیه ریشه نشاء و یا قبل از نشازنی با خاک بستر نشاء مخلوط کنید. تحقیقات نشان داده است که مصرف نواری بهتر از مخلوط کردن با خاک است.

جدول ۲- مقادیر توصیه شده فسفر و پتاسیم در کشت بادمجان بر اساس آزمون خاک (داربی، ۱۹۹۰)

درجه پتاسیم		کم		متوسط		زیاد		خیلی زیاد	
درجه فسفر		P2O5	K2O	P2O5	K2O	P2O5	K2O	P2O5	K2O
کم		۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۹۰	۱۲۰	۶۰	۱۲۰	۳۰
متوسط		۸۰	۱۲۰	۸۰	۹۰	۸۰	۶۰	۸۰	۳۰
زیاد		۴۰	۱۲۰	۴۰	۹۰	۴۰	۶۰	۴۰	۳۰
خیلی زیاد		۰	۱۲۰	۰	۹۰	۰	۶۰	۰	۳۰

- نیتروژن: خاکهای معمول دشت ها ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار ازت نیاز دارند. خاکهای شدیداً شنی مقدار و یا تعداد دفعات مصرف بیشتری ازت نیاز دارند. میزان نیاز به ازت می تواند بسته به فصل زراعی، میزان بارش، نوع خاک، آبیاری، تراکم گیاهی، طول مدت برداشت و روش و زمان کاربرد تفاوت نماید. خاکهای آهکی کوهپایه ها، کوهها و دره ها ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار ازت نیاز دارند. ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم از کود سرک توصیه شده را در زمانیکه اولین میوه ها به اندازه تخم مرغ هستند و بقیه را بسته به نیاز طی ۱ تا ۳ مرحله مصرف می کنیم. درمورد خاک های سنگین کوهپایه ها و دره ها ازت کمتر و در تعداد دفعات مصرف کمتری نیاز است. بهتر است کود ازته به صورت نواری مشابه با آنچه که برای پتاس شرح داده شد مصرف گردد (داربی، ۱۹۹۰).

استفاده از کودهای کامل شامل عناصر پرمصرف و کم‌مصرف، همچون کودهای ۲۰-۲۰-۲۰، ۱۵-۱۵-۱۵، ۱۲-۱۲-۱۲، ۱۵-۳۰-۱۵ و غیره به صورت محلول‌پاشی و یا کودآبیاری (حل کردن کود در آب آبیاری) می‌تواند تاثیر به سزائی در رشد و نمو بوته‌ها و میوه‌ها داشته باشد. بهتر است در ابتدای مراحل رشد از کودهای با درصد فسفر بالا جهت ریشه‌زائی و استقرار بهتر بوته‌ها و در مرحله گل‌دهی و میوه‌دهی از کودهای با درصد پتاسیم بالاتر جهت باروری بالاتر و بهبود عملکرد استفاده گردد.

آماده سازی مزرعه

آماده سازی زمین اصلی بایستی در اولین فرصت ممکنه صورت پذیرد تا اینکه انتقال نشاء در اولین زمان ممکن و در روزهای خنک بهار انجام پذیرد. تأخیر در انتقال نشاء بادمجان و مصادف شدن با روزهای گرم تلفات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت که علاوه بر کاهش میزان تولید میوه یا بذر، هزینه های غیر ضروری را نیز به برنامه کشت وارد خواهد کرد. از جمله مشکلات تأخیر در انتقال نشاء می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- ۱- تلفات بالای نشاء در اثر گرمای هوا
- ۲- کاهش راندمان نیروی کارگری به دلیل گرمی هوا و در نتیجه بی دقتی آنها در انتقال صحیح نشاء
- ۳- تلفات بیشتر نشاهای جوان در اثر برخورد با لبه داغ مالچ پلاستیکی
- ۴- مصادف شدن زمان گلدهی و گرده افشانی با گرمای بیش از حد هوا در مرداد ماه و در نتیجه کاهش عملکرد میوه و بذر
- ۵- طغیان کنه تارتن در مرحله حساس گلدهی
- ۶- نیاز به وجین بیشتر به دلیل غالب تر شدن علف های هرز به نشاهای جوان (کشت به موقع باعث برتری بوته های بادمجان به علف های هرز شده و تا حد زیادی از رشد آن ها جلوگیری خواهد کرد)
- ۷- برخورد زمان بذرگیری با روزهای سرد پاییز و زمستان و در نتیجه نیاز به هزینه های گرمائی جهت سالن بذرگیری و همچنین مراحل خشک کردن بذور

با توجه به موارد مذکور و جهت بالا بردن میزان درآمد بسیار ضروریست که آماده سازی زمین مزرعه اصلی در اولین فرصت ممکنه صورت پذیرد.

توصیه می گردد که حتی الامکان، زمین مورد نظر در فصل پاییز شخم زده شود. شخم پاییزه علاوه بر کمک به جذب بهتر نزولات آسمانی در فصول پاییز، زمستان و بهار، عملیات خاک ورزی زمین در بهار را تا حد بسیار زیادی جلو می اندازد. در غیر اینصورت، در اواخر اسفند یا اوایل بهار، به محض اینکه خاک مزرعه گاورور گردید، اقدام به عملیات خاک ورزی اولیه و ثانویه می کنیم. توصیه می گردد میزان ۳۰ تا ۴۰ تن کود دامی کاملاً پوسیده، قبل از خاک ورزی اولیه در زمین پخش گردد. این عملیات هر ۳ تا ۴ سال یکبار می بایستی تکرار گردد. با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک اکثر مناطق ایران، و در نتیجه میزان پایین مواد آلی خاک های زراعی در این کشور، جدی نگرفتن مسئله کود دامی اثرات غیر قابل جبرانی را برای خاک مزرعه در پی خواهد داشت.

قبل از انجام عملیات خاک ورزی ثانویه، با توجه به نتیجه آزمون خاک، کودهای شیمیائی به میزان لازم در سطح مزرعه پخش می گردد. سپس دیسک سنگین انجام می گردد تا اینکه کودهای شیمیائی با خاک کاملاً مخلوط گردند و همچنین علف های هرز جوانه زده یا سبز شده معدوم شوند. در صورت مناسب بودن خاک مزرعه پس از تسطیح، نسبت به ایجاد جوی و پشته و مالچ کشی اقدام می گردد (شکل ۳).

پس از ایجاد جوی و پشته عملیات نصب سیستم آبیاری قطره ای انجام و مالچ کشی بر روی تیپ های آبیاری انجام می گردد (شکل ۳). نصب صحیح تیپ ها، تثبیت نمودن آن ها در محل مناسب و مالچ کشی مناسب در گيرائی نشاها و همچنین مراحل آتی مزرعه بسیار تأثیر گذار می باشد. هر نوع کوتاهی یا بی دقتی در این مرحله می تواند باعث ایجاد مشکلات عدیده در مرحله انتقال نشاء و در نتیجه تلفات بالای نشاء و محصول گردد.



شکل ۳- مالچ کشی مکانیزه و زمین آماده انتقال نشاء

طرز تهیه خزانه تولید نشاء

اهمیت تولید نشاء

امروزه در کشاورزی نوین و مکانیزه، صنعت تولید نشاء به عنوان حرفه ای کاملاً تخصصی، اشتغال زا و پر درآمد مطرح است. در کشور ما با توجه به افزایش روزافزون سطح زیر کشت محصولات مختلف سبزی و صیفی، بویژه توسعه سیستم های کشت گلخانه ای، توجه به هسته های اولیه تولید یعنی بذر و نشاء اهمیت فراوانی دارد. از طرفی با افزایش هزینه های تولید مانند افزایش

قیمت بذر و محدودیت تولید بذور هیبرید، محدودیت منابع آبی و سایر نهاده های تولید استفاده از تکنیک تولید نشاء مزایای فراوانی نظیر مصرف بذر کمتر، زودرسی محصول، امکان کنترل بهتر شرایط محیطی در مراحل مختلف تولید، کنترل مناسب تر آفات و بیماریها، امکان انتخاب گیاهان قوی و سالم جهت کاشت، عدم نیاز به عمل گزینش و یا تنک کردن، بر خورداری از ارزش اقتصادی بیشتر برای محصول تولیدی را دارا می باشد. در کشور ما هر چند برخی از تولید کنندگان، شرکتها و یا موسسات تولیدی به صورت تجاری در جهت رفع نیازهای خود و یا بازارهای منطقه ای در سطح تجاری اقدام به تولید نشاء محصولات مختلف سبزی و صیفی می نمایند، اما اکثر تولید کنندگان، یا با این روش تولید آشنایی چندانی ندارند و یا بعضاً اقدام به تولیداتی با کیفیت پایین و فاقد استاندارد مطلوب مانند تولید نشاهای با ساقه و برگ نازک و آبکی و حساس و دارای علایم کمبود عناصر غذایی و آلوده به انواع عوامل پاتوژنی را بدون انجام مراقبتهای ویژه وارد بازار می کنند که به موازات آن نارضایتی هایی نظیر عدم گیرایی و استقرار نامناسب نشاها در زمین اصلی، حساسیت به سرما و یخبندان را به همراه داشته و نیاز به خرید مجدد نشاء جهت واکاری و صرف هزینه های واکاری و ... را در پی خواهد داشت.

اگرچه بذر بادمجان ممکن است به صورت مستقیم در مزرعه اصلی کشت گردد ولیکن به دلایل زیر معمولاً به صورت نشائی کشت می گردد.

- کنترل علف های هرز در حالت کشت مستقیم بسیار سخت تر از کشت نشائی است.

- بذر پاشی مستقیم نیازمند بستر بذر عالی است و ممکن است نیازمند تخصیصی کردن تجهیزات کاشت باشد.

- به علت سطحی بودن عمق کاشت بادمجان، زمین بایستی به خوبی تسطیح شده باشد تا مانع از شسته شدن و یا مدفون شدن بذور گردد.

- در کشت مستقیم، زمان برداشت بهاره حداقل ۳ تا ۴ هفته دیرتر است این در حالی است که در نشاکاری ما استفاده بهتری از فصل کشت خواهیم داشت.

- در حالت نشائی بهترین تراکم را خواهیم داشت چراکه پس از سپری شدن شوک های گرمائی و رطوبتی و گرمائی، نشاء زده می شود و همچنین نیاز به تنک کردن هم نخواهد بود.

تجهیزات آبیاری در خزانه و گلخانه

امروزه سیستم های آبیاری جهت تولید نشاء به دو گروه کلی سیستم های آبیاری پاششی و سیستم های غرقاب زهکش تقسیم می شوند. هر کدام از این سیستم ها را می توان با استفاده از دستگاه های اتومات به صورت خود کار در آورد و آبیاری یکنواختی را انجام داد. در صورت نصب لوله های انتقال اضافی، می توان از سموم حشره کش نیز در این سیستم ها استفاده نمود.

نوردهی در خرانه و گلخانه

در اغلب نواحی تولید گلخانه ای در جهان، شدت نور طبیعی در طی زمستان کمتر از مقدار بهینه (کمتر از ۱۵۰۰ فوت کندل یا ۱۶۱۴۰ لوکس) مورد نیاز برای نشاءها است. نور دهی تکمیلی می-تواند میزان فتوسنتز و در نتیجه رشد گیاه را افزایش دهد.

سیستم تولید نشاء در شرایط گلخانه ای

سیستم تولید گلخانه ای نشاء نسبت به تولید آن در فضای آزاد دارای مزایای زیر است:

- تولید سریع تر و یکنواخت تر نسبت به تولید نشاء در فضای آزاد
- مدیریت بهتر آبیاری و تغذیه
- قابلیت نگهداری نشاءها در گلخانه تا زمان مورد نیاز
- استفاده بهینه و یکنواخت از فضای گلخانه به علت استفاده از ظروف کشت
- قابلیت تولید گیاهانی سالم، ضخیم و با ارتفاع مناسب
- توانایی استقرار بهتر نشاهای حاصله نسبت به نشاهای فضای آزاد
- زود رسی نسبت به نشاهای فضای آزاد

ظروف کاشت

ظروف کاشت مورد استفاده در تولید نشاء بسته به تکنولوژی تولید و عوامل اقتصادی منطقه می تواند متفاوت باشد. انواع گلدان، جعبه ها یا سینی های کاشت پیتی، سفالی، فیبری، استیروفومی و پلاستیکی همگی می توانند در تولید نشاء مورد استفاده قرار گیرند. امروزه بیشتر نشاها را در سینی های پلاستیکی و پلی استیرنی پرورش می دهند. سینی های نشایی که دارای تعداد مشخصی حفره و باحجم مشخص هستند و برای تولید نشاء تویی از آن ها استفاده می شود از رایج ترین و اقتصادی ترین ظروف نشاء هستند. سینی هایی که اندازه خانه آن ها ۴ سانتی متری است، عموماً دارای ۱۲۸ خانه هستند و آن هایی که خانه های ۶ سانتی متری دارند، تقریباً ۷۲ خانه ای هستند. استفاده از سینی های دارای حفره های کوچک، هزینه تولید و همچنین اندازه نشاء را کاهش می دهد اما به دلیل این که نشاهای تولیدی در این خانه های کوچک، سیستم ریشه ای کوچکی دارند و در زمان بیرون کشیدن نشاء سطح مشترک بیشتری از ریشه-خاک در آنها به هم می خورد، زودرسی و کیفیت نشاء را کاهش می دهند.

جنس مواد سازنده سینی های نشاء بسیار متفاوت است و از سفال گرفته تا استیروفوم و پلاستیک می تواند متغیر باشد. کیفیت هر کدام از آن ها بستگی به استحکام موردنیاز تولیدکننده دارد. برای تولید تجاری نشاء و کاهش هزینه ها استفاده از سینی های ساخته شده از موادی غیر از استیروفوم یا پلاستیک توصیه نمی شود. در سینی های کهنه به دلیل وجود ترک های ریز، مواد غذایی و یا عوامل بیماری زا نفوذ می کنند و درنهایت باعث رشد غیریکنواخت نشاها می شوند. درمقایسه با سینی های پلاستیکی سینی های استیروفوم گران تر بوده، محیط رشد را جدا کرده، رشد دانها را به تأخیر انداخته و باعث افزایش تشکیل جلبک و شیوع بیماری ها می شوند. از این رو معمولاً از سینی های پلاستیکی استفاده می شود. سینی هایی که رنگ تیره تری دارند گرمای بیشتری جذب کرده و رشد نشاء در آن ها سریع تر از سینی های رنگ روشن است.

هرچه سینی عمیق تر باشد، حجم بیشتری خواهد داشت و بنابراین آب و کود بیشتری در اختیار گیاه قرار می گیرد. در سلول های عمیق تر رشد سریع تر بوده و تعداد دفعات آبیاری نیز کمتر از سلول های کم عمق است اما برای این که تمام محیط کشت خیس شود نیاز به آب بیشتری است. برای افزایش یکنواختی هرگز نباید سینی های کم عمق و عمیق، یا سینی هایی با رنگ های متفاوت را برای تولید یک نوع نشاء به کار برد.

بعضی از مخلوط های غیر خاکی حاوی کود هستند که مقدار آنها باید برای برنامه ریزی کودی مد نظر قرار گیرد. هر چه میزان کود اولیه در این محیط ها کمتر باشد کنترل بیشتری را می توان روی رشد نشاءها داشت، چون افزودن کود مورد نیاز، بسیار آسانتر از حذف آن از محیط است.

خصوصیات بذر

همیشه سعی گردد که از بهترین بذر برای تولید نشاء استفاده شود، چون استفاده از بذر ارزان هیچگونه سودی ندارد. در اصل، هزینه بذر درصد ناچیزی از کل هزینه تولید را شامل می شود. از این رو هیچگاه از بذره های تجاری هیبریده های F1 اقدام به تولید بذر ننمائید زیرا دچار پس روی ژنتیکی می شوند و به هیچ عنوان یکنواختی و کیفیت بذره های والدی را نخواهند داشت. بهتر است برای تولید بذر در مناطقی با خاک های سالم و عاری از بیماری اقدام نمود. ۱۲۵ تا ۲۰۰ گرم بذر برای تهیه نشاء یک هکتار بادمجان کافی است. اگر بذر تازه و سالم در خاک استریل کشت شود نیاز به تیمار خاصی ندارد، در غیر این صورت بذور می بایست به مدت ۳۰ دقیقه در آب گرم (۵۰ درجه سانتیگراد) خیس گردد. سپس در آب سرد شسته و قبل از کشت خشک گردند. بذور ممکن است برای جلوگیری از آلودگی نشاءها با تیرام یا قارچ کش دیگری تیمار گردند. برای تولید نشاء حتی الامکان از بذور تازه استفاده کنید، بذور مسن تر از دو سال، قدرت و توان جوانه زنی کمتری دارند. بذور را می توان در ظروف خاص یا در گلدان های تورپی کشت کرد. در این صورت کشت مزرعه ای بدون بهم ریختگی

سیستم ریشه انجام می پذیرد. بذور همچنین ممکن است در بسترهای خاکی نشاء کشت گردند. مورد اخیر در ایران رایج تر می باشد. این بسترها می بایست حاصلخیز و کاملاً زهکش شده باشند. بسترهای نشاء با ۴۰ گرم در مترمربع سولفات آمونیوم، ۵۰ گرم در مترمربع سوپرفسفات، ۳۰ گرم در مترمربع کلرید پتاسیم و ۲ کیلوگرم در مترمربع کمپوست غنی می گردند. بسترهای نشاء را به ارتفاع ۱۵ سانتیمتر و عرض ۰/۸ متر آماده کرده و بذور به فاصله ۶ سانتیمتر از یکدیگر روی بستر نشاء پخش می گردند و لایه نازکی به ضخامت ۰/۵ سانتیمتر کمپوست، گلش برنج، کوددامی و موارد مشابه روی بذرها پاشیده می شود. سپس بسترها کاملاً آبیاری می گردند. درحین آبیاری لازم است دقت گردد که بذور جابجا نگردند و بستر نیز کاملاً خیس گردد. بدین منظور می توان بسترها را به روش قطره ای آبیاری کرد. پس از آبیاری بسترهای کشت، روی آنها با ارتفاع مناسبی توسط سیم یا توری و پلاستیک پوشانیده می شود. کاربرد پلاستیک مناسب مناطقی است که در هنگام کشت بذور، هوا هنوز به مقدار کافی گرم نشده است. دمای بهینه برای جوانه زنی ۲۴ تا ۲۹ درجه سانتیگراد است. در این دما نشاها در ۶ تا ۸ روز ظاهر می شوند. نشاها مرتباً سرکشی شده و در صورت نیاز آبیاری می گردند. ۲ هفته پس از کشت بذور، نشاها کوددهی می شوند. (ترجیحاً با محلولی از کود قابل حل در آب). در صورت متراکم بودن نشاها، آنها در مرحله اولین برگ حقیقی تنک می گردند. تولید نشاها تقریباً به ۶ تا ۸ هفته زمان نیاز دارد (چن و دیگران، ۲۰۰۲ و پیوست، ۱۳۸۱).

آبیاری و کوددهی مناسب به تولید نشاء خوب و سالم و استقرار آن در مزرعه کمک می کند. البته باید در نظر داشت که میزان زیاد آب و کود، باعث نرم شدن بافت های گیاهی و بالارفتن حساسیت آنها به عوامل بیماری زا خواهد شد. تنش های آبی و تغذیه ای روش های مهمی هستند که در تغییر اندازه شکل سرعت رشد و مقاوم شدن نشاها قبل از انتقال به مزرعه مورد استفاده واقع می شوند.

انتقال نشاء

یک نشای ایده آل، گیاهیچه ای است به ارتفاع ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر، ریشه دار، عاری از بیماری و بدون جوانه گل (شکل ۴). نشاهای مسن تر پس از انتقال واکنش رشدی سریعی نشان نمی دهند. عمل مقاوم سازی نشاها باید یک تا دو هفته قبل از انتقال نشاها به مزرعه صورت پذیرد. این کار با کم کردن تدریجی آب، به منظور مقابله با تنش رطوبتی پس از نشاکاری، هوا دهی به منظور مقاومت در برابر کاهش درجه حرارت و همچنین آفتاب دهی به منظور مقاومت به تابش مستقیم آفتاب در مزرعه صورت می گیرد. چند روز قبل از انتقال نشاها پوشش پلاستیکی آنها کاملاً برداشته می شود. نشاها ۱۲ تا ۱۴ ساعت قبل از انتقال کاملاً آبیاری می شوند. انتقال نشاها بهتر است در هنگام عصر یا در روزهای ابری صورت گیرد تا شوک انتقال نشاء به حداقل برسد. نشاکاری می تواند با دست یا با ماشین های نشا کار صورت گیرد (چن و دیگران، ۲۰۰۲).

در ایران، نشاکاری معمولاً به دو صورت انجام می گیرد: ۱- نشاکاری در زمین کاملاً خیس که آب در داخل جویها در حرکت است و نشاها در منطقه داغ آب زده می شود. ۲- نشاکاری در خاک گاوارو که در این حالت توسط یک چوبدستی چاله هایی در منطقه داغ آب ایجاد می گردد. نشاها در چاله ها قرار می گیرند و سپس چاله ها پر از آب شده و خاک دهی می گردند. مورد اخیر در منطقه ورامین معمول تر می باشد. در حالت مکانیزه، انتقال نشاء توسط ماشین نشاء زن صورت می گیرد (شکل ۵). پس از استقرار نشاها و به منظور جلوگیری از افتادگی آنها در اثر باد و همچنین وزن میوه ها در مراحل آتی رشد گیاه ضروری است که خاک دهی پای بوته ها انجام گردد.

جهت تولید نشاء بادمجان چند نکته حائز اهمیت بالائی است:

۱- تعداد نشاء مورد نیاز



شکل ۴- نشای ایده آل بادمجان جهت انتقال شکل ۵- نشازنی بادمجان با ماشین نشازن

وزن هزاردانه بذر بادمجان بطور متوسط حدود ۴ گرم می باشد. میزان بذر مورد نیاز جهت کشت یک هکتار بادمجان بسته به میزان تراکم مورد نظر در مزرعه اصلی و همچنین روش تهیه نشاء بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ گرم متغیر می باشد. جهت تامین تراکم حدود ۱۵۰۰۰ بوته در هکتار و با توجه به تلفات موجود در زمان تولید و انتقال نشاء به مزرعه و همچنین نیاز به واکاری، می بایستی برنامه ریزی تولید حدود ۲۳۰۰۰ نشاء داشته باشیم که نیاز به ۱۵۰ گرم بذر بادمجان با قوه نامیه مناسب دارد. البته این عدد در شرایط بسیار ایده آل و تولید مکانیزه نشاء در سینی های کشت می باشد.

۲- زمان تولید نشاء

زمان تولید نشاء بادمجان به گونه ای برنامه ریزی گردد که حتی الامکان در اولین فرصت به انتقال نشاء به زمین اصلی اقدام گردد (شکل ۲). هر چقدر انتقال نشاء در روزهای خنک تر صورت پذیرد، میزان گیرائی بالاتر بوده و تلفات کمتری خواهیم داشت.

۳- بذر مطلوب

با توجه به هدفی که از تولید محصول بادمجان داریم یک وارسته تجاری مطلوب انتخاب می گردد. وقتی هدف تولید بذر است قطعاً می بایستی رقمی را انتخاب نمائیم که محبوبیت خوبی در بین کشاورزان داشته و بازار فروش بذر این وارسته مطلوب باشد. برای ارقام جدیدتر نیاز به برنامه بازاریابی

و تبلیغات مناسب می باشد که برای شرکت هائی بذری نوپا توصیه این است که حتی الامکان با بذور واریته های معروف شروع نمایند. علاوه بر رقم مناسب، بذر مورد نظر بایستی دارای خصوصیات کیفی مناسب از قبیل خلوص بالای ژنتیکی و فیزیکی، قوه نامیه و درصد سبز شدن بالا، آغشته به قارچ کش مناسب و ... باشد.

۴- سینی کشت

جهت تولید نشاء بادمجان روش تولید نشاء در سینی کشت و در گلخانه توصیه می گردد. به این منظور سینی های کشت با ابعاد و تعداد حفره های مختلف (از ۲۸ حفره ای تا ۲۲۰ حفره ای) در بازار موجود و جهت تولید نشاء قابل استفاده می باشند. جهت تولید نشاء بادمجان در سطح تجاری، دو موضوع تعیین کننده انتخاب نوع سینی می باشد: ۱- تولید نشاء قوی و ۲- مقرون به صرفه بودن. با توجه به موارد مذکور و به تجربه استفاده از سینی های ۱۲۸ حفره ای (۸×۱۶) تا ۱۶۲ حفره ای (۹×۱۸) توصیه می گردد. استفاده از سینی های با حفره های بیشتر (همانند ۲۱۶ حفره ای) نشاهای قوی نداده و یا اینکه برخی از حفره ها خالی از نشا خواهند بود و سینی های با حفره های کمتر مقرون به صرفه نخواهد بود (شکل ۶).



شکل ۶- انواع سینی کشت جهت تولید نشاء بادمجان

۵- بستر کشت

سینی های کشت را می توان با انواع مختلفی از بسترهای کشت پر نمود. شاید بهترین بستر کشت جهت تولید نشاء، پیت موس آن هم ساخت شرکت های با برند معتبر باشد، ولیکن بی شک از نظر هزینه، مقرون به صرفه نخواهد بود. جهت انجام مطالعات تحقیقاتی که نتایج اهمیت بالائی داشته و در بسیاری از موارد نیز کمبود بذر وجود دارد این بستر کاملاً توصیه می گردد. در سطوح پایین تولید نشاء نیز به راحتی می توان از این بستر استفاده نمود، چرا که با توجه به اینکه پیت موس از نظر مواد غذائی غنی می باشد لذا نیاز به رسیدگی و تیمارهای مختلف کودی در مرحله تولید نشاء را کم می کند، ولیکن تولید نشاء در سطح تجاری داستان دیگری است. در تولید تجاری تا حد امکان می بایست هزینه ها را کم کنیم. بدین منظور می توانیم از کوکوپیت به عنوان بستر کشت استفاده کنیم که قیمت آن به مراتب کمتر از پیت موس است. کوکوپیت به شکل قالب های فشرده در بازار وجود دارد. هر قالب کوچک کوکوپیت پس از خیساندن با آب به حجم ۵۰ لیتر می رسد و لذا تعداد زیادی سینی را می توان با آن پر کرد. در زمان پر کردن سینی های کشت با کوکوپیت خیس شده بایستی حتماً با غلطک مخصوص کوکوپیت را در حفره های سینی فشرده نمائیم (شکل ۷).

۶- بذریزی

جهت کشت بذر در سینی نشاء دو روش دستی و مکانیزه وجود دارد. در روش دستی بذور با پنس برداشته شده و در هر حفره، یک بذر قرار داده شده و در بستر فشرده می گردد (شکل ۸). در روش مکانیزه، کشت بذور در حفره های سینی کشت توسط یک دستگاه نسبتاً ساده ولی دقیق انجام می گیرد. این دستگاه در هر حفره یک بذر قرار داده و با فشار یک اهرم بذر را در محل خود تثبیت می کند. این دستگاه ها قابلیت کشت ۱۰۰ تا ۱۵۰ سینی کشت (حدوداً ۲۰۰۰۰ نشاء) در ساعت را دارا هستند (شکل ۹).



شکل ۷- نحوه پر کردن سینی های نشاء



شکل ۸- بذرکاری دستی سینی نشاء



شکل ۹- دستگاه بذرکار سینی کشت نشاء

۷- گلخانه

محل قرارگیری سینی‌های کشت می باید از نظر دما و رطوبت شرایط مناسبی داشته باشد، دمای متوسط گلخانه تا قبل از سبز شدن نشاها می‌بایستی حدود ۲۵ درجه سانتی گراد باشد. دماهای پایین تر باعث تأخیر بیش از حد در جوانه زنی و سبز شدن شده و ممکن است منجر به گندیدگی بذور در بستر کشت گردند. پس از سبز شدن نشاها بهتر است دما را پایین تر و حدود ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی گراد در روز و ۱۰ تا ۱۸ درجه سانتی گراد در شب نگه داریم. این دما باعث ریشه زائی بهتر و همچنین

تولید نشاها ضخیم و قوی می‌گردد. علاوه بر این به دلیل کاهش رشد اندام هوایی، از شلوغی بیش از حد و درهم ریختگی نشاهای مجاور هم جلوگیری می‌کند. لذا گلخانه می‌بایست مجهز به سیستم گرمایشی، سرمایشی و همچنین تهویه مناسب باشد. نکته بسیار مهم این است که حتی‌الامکان می‌بایستی سینی‌های کشت بر روی سکو قرار گیرند، چراکه کف گلخانه معمولاً دمای سردی داشته و لذا علاوه بر تأخیر در رشد نشاها، باعث غیریکنواختی در تولید نشاها در مناطق مختلف گلخانه می‌گردد. بهتر است گلخانه مجهز به سیستم آبیاری مکانیزه باشد تا یکنواختی بهتری در آبیاری و تغذیه نشاها داشته باشیم. آبیاری دستی نشاها بعضاً با فشارهای زیادتر باعث بیرون ریختن بذور از سینی‌ها و یا خم شدن و شکستن نشاها پس از سبز شدن می‌گردد (شکل ۱۰).

۸- تغذیه

تغذیه نشاها بایستی طبق یک برنامه مدون انجام پذیرد. استفاده از کوکوپیت به عنوان بستر کشت نیاز به تغذیه نشاها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. تغذیه نشاها معمولاً همراه با آب آبیاری صورت می‌گیرد. میزان مورد نیاز از کود مورد نظر را در مخزن اصلی آب مخلوط کرده و همراه آب آبیاری به نشاها رسانده می‌شود. با توجه به اینکه کوکوپیت تقریباً عاری از هر ماده غذایی می‌باشد، لذا ضروری است که جهت تغذیه نشاها، از کودهای کاملی که دارای ترکیب مناسبی از عناصر ماکرو و میکرو می‌باشند استفاده نمائیم. بهتر است در ابتدای مرحله رشدی از کودهای فسفر بالا (جهت ریشه زائی بهتر) و در مراحل بعدی از کودهای با ازت و پتاس بالاتر استفاده نمائیم. استفاده از ۸۰ گرم کود کامل در ۱۰۰ لیتر آب آبیاری در هر مرحله آبیاری می‌تواند میزان مناسبی باشد. برای شروع بهتر رشد نشاها می‌توان از کودهای استارتر که شامل محلول رقیقی از کودهای قابل حل در آب با میزان فسفر بالا می‌باشند استفاده نمود. برای نشاء بادمجان نسبت ۶/۲۵ گرم کود استارتر در ۱ لیتر آب آبیاری مناسب می‌باشد.



شکل ۱۰- گلخانه تولید نشاء

۹- مبارزه با آفات و بیماری ها در گلخانه

مهمترین موضوع رعایت بهداشت گلخانه می باشد. می بایست از بذور ضدعفونی شده استفاده نمود. استفاده از کارت ها و نوارهای رنگی جهت به تله انداختن آفات گلخانه توصیه می گردد. رطوبت بالای گلخانه می تواند باعث شیوع بیماری های قارچی گردد که در این صورت می توان از قارچ کش های مناسب محلول در آب آبیاری و یا حتی به صورت سمپاشی جداگانه استفاده کرد.

۱۰- مقاوم سازی (Hardening)

نشاها را نمی توان بطور مستقیم از گلخانه (خزانه) به مزرعه منتقل کرد، چراکه شوک ناگهانی وارد شده به نشاها می تواند تلفات بسیار سنگین را در پی داشته باشد. معمولاً حدود ۱۰ روز قبل از انتقال نشاء به مزرعه اصلی عملیات مقاوم سازی نشاها انجام می پذیرد. به این منظور می توان از دو روش استفاده کرد: ۱- قرار دادن نشاها در دماهای پایین تر از حد معمول، ۲- کاهش آبیاری و اجازه به خشک شدن بستر کشت و ۳- ترکیبی از این دو. در هر صورت دمای مقاوم سازی نشای بادمجان نباید کمتر از ۱۳ درجه سانتی گراد باشد.



شکل ۱۱- نشاء بادمجان

نکاتی که باید برای انتقال نشاء مد نظر قرار گیرند

سن نشاء

هر یک از سبزی های معمولی را می توان به طور رضایت بخشی در طول مراحل اولیه رشد، نشاء نمود. در مورد ذرت، لویا و کدوئیان، تنها دوره کوتاهی است که طی آن با نشاء کردن صدمه شدیدی نمی بینند. سهولت در نشاکاری گیاه با افزایش سن کاهش می یابد و تفاوت بین گونه ها با افزایش سن برجسته تر خواهد شد. در سن یک هفتهگی بیشتر گونه ها می توانند با حداقل تأخیر در رشد، نشاکاری شوند در صورتی که بعد از ۴ هفته، نشاکاری گیاهانی که به سختی نشاکاری می شوند، افت بیشتری خواهند داشت.

سرعت جایگزینی ریشه ها و قدرت جذب آب

بازگشت شادابی گیاهان پس از انتقال نشاء عمدتاً بستگی به قدرت جذب آب دارد که خود وابسته به سرعت جایگزینی ریشه ها است. سهولت تجدید رشد ریشه ها با تداوم رشد نشاء همبستگی دارد. تجدید رشد ریشه ها بستگی به میزان چوب پنبه ای شدن و تشکیل کوتین در لایه های درون پوستی ناحیه ریشه دارد. تشکیل این لایه ها توسط ریشه های باقیمانده نشاء را بعد از نشاکاری کاهش می دهد. رسوب چوب پنبه یا کوتین در آندودرم یا پریدرم علاوه بر ایجاد اشکال در جذب آب باعث منشعب شدن ریشه نیز می شود.

قیم زنی و خاک دهی پای بوته ها

پس از این که نشاها استقرار پیدا کردند به منظور جلوگیری از افتادن نشاها در اثر باد و همچنین مقاومت بوته ها در برابر وزن میوه ها در مراحل آتی رشد گیاه ضروری است که خاک دهی پای بوته ها انجام گردد. در مرکز جهانی سبزیجات (AVRDC) یک ماه پس از نشازنی در کنار هر بوته یک قیم (معمولا نی هندی) به ارتفاع ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر زده می شود (شکل ۱۲). در ایران این کار معمول نیست و معمولا خاک دهی پای بوته ها در یک یا دو مرحله صورت می پذیرد تا بوته ایستایی بهتری داشته باشد. با این وجود در این روش تعدادی از بوته ها دچار خوابیدگی خواهند شد (چن و دیگران، ۲۰۰۲).



شکل ۱۲-قیم زنی در کشت بادمجان

هرس

به منظور تولید میوه هایی با رنگ شفاف و کیفیت بالا، هرس شاخ و برگ در بادمجان انجام می گردد. در هرس شاخه، برای هر بوته سه شاخه، دو شاخه از اولین تقسیم از ساقه اصلی و یک شاخه بعد از این تقسیم نگه داشته می شود. تمامی شاخه های دیگر به صورت ادواری حذف می گردند (چن و دیگران، ۲۰۰۲).

در هرس برگ، به منظور گردش هوای بهتر و همچنین نوررسانی بهتر در کانوپی، برگ های پیرتر از قسمت های پائین تر گیاه حذف می گردند. در برخی مناطق بادمجان کاری ایران مثل ورامین، در اواخر فصل رشد یک نوع هرس به نام سرزنی صورت می گیرد. بدین صورت که نوک سرشاخه بوته ها زده می شود. این عمل باعث می گردد که میوه دهی در قسمت های تحتانی بیشتر گشته و بوته جوان تر می گردد.

مالچ گذاری

به منظور کاهش علف های هرز، جلوگیری از فشردگی خاک و حفاظت رطوبت خاک، مالچ گذاری در کشت بادمجان توصیه می گردد. دو نوع مالچ برای بادمجان قابل پیشنهاد است. مالچ آلی و مالچ پلاستیکی. مالچ های آلی همانند گلش برنج و موارد مشابه معمولاً پس از نشاکاری به کار می روند. این مالچ ها رطوبت خاک را حفظ می کنند، مواد آلی خاک را افزایش می دهند و دمای خاک را پائین می آورند. مالچ های پلاستیکی قبل از نشاکاری بر روی پشته ها و یا کف جوی ها کشیده می شود (شکل ۳). پس از کشیدن پلاستیک می بایست در مکان های نشاکاری سوراخ هایی ایجاد گردد. مالچ پلاستیکی برای کنترل علف های هرز مد نظر است. مالچ با پلاستیک سیاه بطور مؤثری علف های هرز را کنترل می کند. ترکیبی از دو مالچ آلی و پلاستیکی بسیار مناسب خواهد بود (چن و دیگران، ۲۰۰۲).

آبیاری

زمین بادمجان باید دائماً مرطوب و نم دار باشد. آبیاری در زمان گلدهی و تشکیل میوه بسیار بحرانی است. کمبود آب در این دوره می تواند منجر به تشکیل شکوفه های انتهایی پوسیده و میوه بدشکل گردد. کاهش اندازه میوه و عملکرد نیز در اثر استرس رطوبتی پدید می آید. تنش رطوبتی در زمان رسیدگی میوه مهمترین عامل محیطی در تلخ شدن محصول می باشد. پژمردگی در اواخر صبح

علامت خوبی برای نیاز به آبیاری است. توصیه می شود آبیاری بادمجان در تابستان ۳ تا ۴ روز یکبار و در بهار و پائیز ۶ تا ۸ روز یکبار صورت پذیرد. بادمجان یک گیاه ریشه متوسط است که عمق ریشه آن در خاک های با زهکشی خوب حدوداً ۹۰ سانتی متر است. در هر آبیاری می بایستی خاک حداقل تا عمق ۴۵ سانتی متر خیس گردد.

روش آبیاری بستگی به بافت خاک، تسطیح زمین و میزان آب موجود دارد. عموماً آبیاری نشتی (جوی و پشته ای) و سیستم های آبیاری قطره ای استفاده می گردد. مالچ با پلاستیک سیاه میتواند یکنواختی رطوبتی بهتری را در بین دوره های آبیاری ایجاد کند (چن و دیگران، ۲۰۰۲). با توجه به شرایط خشک و نیمه خشک اقلیم کشور، توصیه می گردد که حتی الامکان کشت با مالچ پلاستیکی و آبیاری قطره ای صورت پذیرد تا حداقل اتلاف رطوبت را داشته باشیم.

علف های هرز

رشد اولیه بادمجان نسبتاً کند است و به آرامی استقرار پیدا می کند و چون فاصله بوته ها از هم نیز نسبتاً زیاد است لذا در رقابت با علف های هرز به خصوص در اوایل فصل رشد ضعیف است (ماسیوناس، ۲۰۰۵). علف های هرز متعددی از پهن برگها و باریک برگها برای بادمجان ایجاد مزاحمت می کنند. از جمله این علف های هرز میتوان به تاج خروس، سلمه تره، علف هفت بند، تربچه وحشی، فرفیون، خارشتر، خللر، پنیرک، خرفه، آلاله، بومادران، درمنه، توق، پیچک، بارهنگ، مرغ، پنجه مرغی، قیاق و... اشاره کرد (اصغری و محمودی، ۱۳۷۸). برای کنترل علف های هرز مزارع بادمجان می توان از روشهای زراعی، مکانیکی و شیمیایی استفاده کرد (استال، ۲۰۰۲).

کنترل زراعی

شامل استفاده از مالچ ها، استفاده از گیاهان پوششی در آخرفصل و تناوب زراعی مناسب برای کنترل جمعیت علف های هرز.

کنترل مکانیکی

شامل شخم عمیق در آخر فصل زراعی و همچنین قبل از تهیه زمین بادمجان، کولیتواتور زدن بین ردیف های کشت در طول رشد گیاه و وجین علف های هرز مزرعه توسط کارگر.

کنترل شیمیایی

به خصوص در مناطقی که کارگر گران است بسیار معمول می باشد. با اینکه سطح تولید بادمجان نسبتاً بالا است و تولید آن بسیار شبیه به فلفل و گوجه فرنگی است لیکن تعداد علف کش هایی که برای آن ثبت شده است بسیار کمتر از سایر گیاهان است.

با توجه به محدودیتی که در مصرف سموم شیمیایی وجود دارد کشاورزان می باید یک برنامه کنترل علفهای هرز را پیش بینی کنند که تلفیقی از روش های زراعی، مکانیکی و شیمیایی باشد.

ذیلاً به تعدادی از علف کشهای قابل توصیه در کنترل علف های هرز بادمجان اشاره می گردد (ماسیوناس، ۲۰۰۵).

۱- **بنولید (پرفار):** این علف کش به میزان ۵/۵ تا ۶/۷ کیلوگرم در هکتار قبل از نشاکاری توسط کولیتواتور با خاک مزرعه مخلوط می گردد و یا اینکه با آب آبیاری مصرف می گردد. علف های هرز سلمه تره، خرفه و تاج خروس را به طور متوسط تا خوب کنترل می کند. قابل استفاده زیرمالچ های پلی اتیلن نیز می باشد.

۲- **کلتودیم (سلکت):** برای کنترل علف های هرز یک ساله و برخی گراسهای چند ساله به میزان ۰/۱۱ تا ۰/۲۸ کیلوگرم (ماده مؤثره) در هکتار در طول فصل رشد و تا ۲۰ روز قبل از برداشت محصول بصورت پاشش مستقیم روی علف هرز بصورت متناوب مصرف می گردد ولیکن مصرف آن در سال نباید از ۲/۲ کیلوگرم در هکتار تجاوز کند.

۳-DCPA (۵کتاب): پس از نشاکاری و استقرار بوته ها به میزان ۶/۷ تا ۹ کیلوگرم درهکتار استفاده می گردد. ۴ تا ۶ هفته پس از مصرف خاک را عاری از علف هرز می کند می بایست تا ۸ ماه پس از مصرف از کشت گیاهان حساس خودداری کرد.

۴- ناپروپامید (بورینول): قبل از نشاکاری به میزان ۱/۱ تا ۲/۲ کیلوگرم در هکتار (ماده مؤثره) به عمق ۱ تا ۲ اینچ با خاک مخلوط می گردد. در خاک های شنی و سبک با نسبت پائین و در خاک های سنگین با نسبت بالا مخلوط می گردد.

۵- گراماکسون (پاراکوات): قبل از نشاکاری به میزان ۰/۷ تا ۱ کیلوگرم (ماده مؤثره) درهکتار استفاده می گردد.

۶- ستوکسیدیم (پست): به میزان ۰/۲۱ تا ۰/۳۱ کیلوگرم در هکتار (ماده مؤثره) برای کنترل گراس ها تا ۲۰ روز قبل از برداشت قابل استفاده است. مصرف سالانه آن نباید از ۵ کیلوگرم در هکتار تجاوز کند.

۷- تریفلورالین (تریلین): قبل از نشاکاری به میزان ۰/۵۵ تا ۱/۲ کیلوگرم درهکتار با خاک مزرعه مخلوط می گردد.

۸- هالوسولفورون (ساندآ): به منظور کنترل اویارسلام و پهن برگ های جوان به میزان ۰/۰۲۵ تا ۰/۰۵ کیلوگرم (ماده مؤثره) در هکتار در بین ردیف ها اسپری می گردد. بایستی از برخورد مستقیم سم با بوته های بادمجان اجتناب کرد.

بیماری ها

ذیلاً به تعدادی از بیماری های مهم بادمجان اشاره می گردد (اعتباریان، ۱۳۸۱).

Phytophthora capsici

ساق سیاه

درمحل آلودگی ابتدا لکه ای به رنگ قهوه ای تیره و یا سیاه پدیدار می گردد که به تدریج به طرف بالا و پائین و اطراف محل آلودگی پیشروی می کند. پس از چندی عامل بیماری به بافت های

مجاور لکه نفوذ کرده و مانع جریان شیره های گیاه می گردد. عضو مورد حمله پژمرده و خشک می گردد. گاهی اوقات درمحل آلودگی، زخم و حالت پوسیدگی نیز مشاهده می گردد. در هر صورت اگر شاخه ای آلوده گردد همان قسمت و اگر ساقه اصلی و یا طوقه مورد حمله قرار گیرد تمامی بوته خشک می گردد.

عامل بیماری در خاک وجود دارد و توسط آب آبیاری و وسائل کشاورزی به نقاط مختلف مزرعه جابجا می گردد. اسپوره های عامل بیماری توسط قطرات باران از خاک به میوه ها و شاخ و برگ انتقال می یابند. دمای رشد قارچ عامل بیماری ۱۱ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و دمای بهینه رشد آن ۳۰ درجه سانتی گراد می باشد.

جهت مبارزه، ضد عفونی خاک خزانه، انتقال و انهدام شاخ و برگ آلوده، شخم عمیق و زیر خاک کردن بقایای گیاهان، تناوب زراعی سه ساله، فاصله دار کاشتن بوته ها و در صورت لزوم سمپاشی شاخ و برگ توصیه می گردد.

پوسیدگی ساقه *Phytophthora cryptogea*

این بیماری سبب پوسیدگی طوقه بادمجان می گردد و علائم آن با آنچه در مورد *P.capsici* گفته شد مطابقت دارد.

سفیدک سطحی *Erysiphea polyphaga*

Levillula taurica

Levillula solanacearum

این بیماری توسط گونه های مختلف خانواده Erysiphaceae ایجاد می شود. در ایران قارچ

L.Solanacearum اولین بار در سال ۱۳۴۹ از منطقه قصر شیرین گزارش گردید. قارچ *L.taurica*

علاوه بر بادمجان، روی گوجه فرنگی و سیب زمینی نیز خسارت وارد می کند. قارچ *E.polyphaga*

در روی گیاهان جوان بادمجان در گلخانه در سال ۱۹۷۰ از هندوستان گزارش گردید.

قارچ *E.polyphaga* باعث ایجاد لکه های سفید کثیف در روی برگ می شود این لکه در ابتدا کوچک و گرد بوده و سپس زاویه دار می شود و در روی سطح زیرین و روئی برگ گسترش می یابد و تمام برگ، دمبرگ و ساقه را فرا می گیرد. برگ های پائینی زودتر مورد حمله بیماری قرار می گیرند. برگ های سفیدک زده ممکن است زرد شده دفعتهاً بمیرند.

قارچ *L.taurica* باعث ایجاد لکه های زرد کمرنگ در سطح روئی برگ و ایجاد پوشش سفید رنگ در سطح زیرین برگ می گردد.

برای مبارزه با بیماری سفیدک سطحی استفاده از سموم گوگردی توصیه می گردد.

پژمردگی فوزاریومی *Fusarium oxysporum f.sp.melongena*

این بیماری در قسمت هایی از اروپا و آسیا خسارت وارد می کند ولی در ایران درمورد این قارچ گزارشی در دست نیست.

در این بیماری، رگبرگ ها کوچک، کم رنگ و روشن می شوند، درحالیکه رگبرگ های اصلی سبز باقی می مانند. سپس برگها زرد و پژمرده می شوند. این حالت از برگ های پائینی شروع و به سمت بالا پیشروی می نماید. دمای بهینه برای رشد فوزاریوم بادمجان حدود ۲۸ درجه سانتیگراد است بنابراین این بیماری در هوای گرم شایع می شود.

انتخاب ارقام مقاوم و ضد عفونی خاک برای کاهش اولیه آلودگی در کنترل بیماری بسیار حائز اهمیت است. کاربرد باویستین ۰/۱ درصد و بن لات ۰/۲ درصد بصورت محلول ریزی پای بوته در کنترل بیماری موثر است.

پژمردگی ورتیسیلیومی *Verticillium albo-atrum*

Verticillium dahliae

تقریباً تمامی خاک های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری به قارچ فوق آلوده است. این قارچ به سبزی های مختلف از جمله چغندر، باقلا، خیار، بادمجان، تربچه، ترب، فلفل، سیب زمینی،

ریواس، گوجه فرنگی و هندوانه حمله کرده و خسارت وارد می کند ولیکن بادمجان درمقایسه با سایر سبزی ها، حساس ترین میزبان محسوب می شود.

بوته های بادمجان در تمامی مراحل زندگی به این بیماری مبتلا می شوند. گرچه بیشترین علائم و خسارت بیماری در هنگام میوه دهی مشاهده می گردد. علائم بیماری در ابتدا از برگ های پائینی شروع می شود. تعدادی از این برگها کمی پژمرده می شوند و به رنگ زرد درمی آیند. در مدت کوتاهی برگ ها شدیداً زرد می شوند و قسمت های زرد شده می میرند. ابتدا حاشیه برگ و سپس تمام برگ پیچ می خورد و از گیاه جدا می گردد. در مراحل پیشرفته بیماری، گیاهان کوتوله و کوچک مانده، پژمرده و زرد رنگ می شوند. در گیاهان آلوده میوه ها کوچک تر و کمتر از گیاهان سالم است. در داخل میوه های آلوده ممکن است نوارهای سیاه دیده شوند که نشانگر فساد بافت آوندی است. بافت ساقه های چوبی و ریشه های گیاه قهوه ای می شود که در تشخیص این بیماری در مزرعه کمک زیادی می کند.

برای جلوگیری از ورود عامل بیماری به مزرعه بذور باید به مدت ۳۰ دقیقه در آب ۵۰ درجه سانتیگراد خیسانده شوند. کاربرد کود و کمپوست که از بقایای گیاهان حساس به ورتیسیلیوم تهیه شده است باید خودداری کرد. کشاورزان باید از کاشت بادمجان بعد از گیاهان حساس به ورتیسیلیوم از قبیل سیب زمینی، کدو و گوجه فرنگی اجتناب کنند. بقایای گیاهان را باید بلافاصله بعد از برداشت محصول از زمین خارج نمود. مواد غذایی کافی برای رشد بهینه گیاه به زمین داد. قبل از کاشت بادمجان در زمین آلوده، می بایست خاک را ضد عفونی کرد. سمپاشی خاک با قارچ کش هایی نظیر بنومیل و کاپتان برای کنترل بیماری توصیه می گردد. سمپاشی شاخ و برگ گیاه به عنوان مکمل مبارزه مفید است. اضافه کردن قارچ *Trichoderma spp.* در روسیه انجام می پذیرد. استفاده از ارقام مقاوم به بیماری از بهترین راههای کنترل این بیماری است.

Sclerotinia minar

علائم بیماری در روی ساقه اصلی یا شاخه های فرعی مشاهده می شود. این علائم از محل زخم یا محل انشعاب شروع می شود و بخصوص در نزدیکی سطح زمین مناطق آب سوخته ای با رنگ قهوه ای روشن یا قهوه ای تیره مشاهده می گردد. توده میسیلیوم سفید با سختینه هایی در روی ساقه دیده شده و پوسیدگی نرم را سبب می گردد. در مناطق گرم و خشک شانکرهای خشک توسعه یافته سبب از بین رفتن گیاه می شود بدون اینکه پوسیدگی نرم ایجاد گردد. عامل بیماری بصورت میسیلیوم در روی گیاهانی که در مزرعه باقی مانده اند یا به بصورت سختینه در بقایای گیاهان فصل نامساعد سال را می گذرانند. باد مهم ترین عامل انتشار این بیماری است. عوامل دیگر همچون نشاء آلوده و بذور مخلوط با سختینه نیز در انتقال بیماری نقش دارند. سختینه های خشک برای مدت چند سال می توانند در خاک باقی بمانند. قارچ عامل بیماری به رطوبت زیاد احتیاج داد. در باران های مداوم، مه یا آبیاری بارانی خسارت خیلی شدید است. دمای بهینه برای رشد قارچ ۱۵/۵ تا ۲۱ درجه سانتیگراد است. جهت مبارزه با این بیماری، برخی محققین سمپاشی با کینتوزن را در اوایل فصل موفقیت آمیز دانسته اند. سمپاشی با وینلکوزولین و ایپرودیون مؤثر گزارش شده است. روش دیگر مبارزه، غرقاب کردن زمینها به مدت ۲۳ تا ۴۵ روز، عدم آبیاری بارانی و تناوب طولانی بدون کاشت کاهو، لوبیا و کلم می باشد.

موزائیک بادمجان

در برخی مزارع شهرستان داراب تا ۱۰۰ درصد آلودگی به این بیماری مشاهده شده است. اعتقاد بر این است که لااقل یک ویروس از نوع ویروس موزائیک توتون (TMV) در ایجاد موزائیک بادمجان در داراب دخالت دارد. بهداد (۱۳۵۹) گزارش کرده است که یک نوع موزائیک خفیف با لکه های درشت و اختلافات رنگ ناچیز در شهریار و گیلان مشاهده شده است و احتمال داده است که مربوط به ویروس موزائیک توتون باشد.

سوختگی فوموپسیس (phomopsis blight)

Phomopsis vexans

عامل بیماری به تمامی اندام هوایی گیاه حمله می کند. برگها بطور واضح لکه های خاکستری تا قهوه ای را نشان می دهند. لکه های مسن تر پر از پیکنیدهای سیاه رنگ می شوند. برگ های بیمار ممکن است زرد شده و بمیرند. لزج شدگی ممکن است در دمبرگ ها و ساقه ها توسعه یابد که باعث ایجاد سوختگی در بخش عمده ای از گیاه می گردد. در میوه ها لکه های رنگ پریده آفتاب سوخته مشاهده می گردد که به تدریج به درون میوه نفوذ می کند و متعاقباً به پوسیدگی نرم تبدیل می گردد.

برای کنترل این بیماری کشت واریته های مقاوم، تیمار بذور با مرکوریک کلرید ۰/۱ درصد یا دیگر قارچ کش های جیوه ای، تیمار بذور در آب گرم ۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه، سمپاشی خزانه و مزرعه با مخلوط بوردئکس ۱ درصد بطور متوالی، سمپاشی شاخ و برگ با کربوندازین ۱ درصد (اولین سمپاشی یک ماه پس از کشت و سمپاشی های بعدی ده روز یکبار) و تناوب زراعی توصیه می گردد. مالچ گذاری و آبیاری جوی و پشته ای می تواند انتقال آلودگی توسط آب و خاک را کاهش دهد.

پژمردگی باکتریایی

Pseudomonas solanacearum

این بیماری بسیار مخرب است. خسارت این بیماری در فصول گرم و مرطوب شدیدتر است و گیاهان پژمرده شده به طور ناگهانی می میرند. اگر ساقه های تازه آلوده را برش عرضی داده و در آب قرار دهیم یک عصاره پدیدار می گردد.

برای مقابله با این بیماری، کشت واریته های مقاوم، تیمار بذر با استروپتوسایکلین (۱ گرم در ۴۰ لیتر) بمدت ۳۰ دقیقه، تناوب با گیاهان غیر Solanaceae، کشت بر روی پشته و پیوند بوته روی ریشه های مقاوم توصیه می گردد.

بوته میری

قارچ های عامل بوته میری (Rhizoctonia, phytophthora, pythium) به بذور در حال جوانه زنی حمله می کنند. خسارت هایی در ساقه ایجاد می کنند و باعث افتادگی نشا ها می شوند. برای مقابله با بوته میری، استفاده از واریته های مقاوم، تیمار بذور با باویستین ۰/۱ درصد، استریلیزه کردن خاک و تناوب مطلوب توصیه می گردد.

آفات

آفات بسیار زیادی می توانند به بادمجان حمله کنند ولی تعداد کمی از آنها هستند که خسارت جدی به بادمجان وارد می کنند. در اینجا مهم ترین این آفات ذکر می گردد (خانجانی، ۱۳۸۴).

Tetranychus urticae

کنه تارتن دو لکه ای

این آفت انتشار جهانی دارد و یکی از پلی فاضل ترین آفات شناخته شده محصولات کشاورزی دنیا می باشد. این کنه از مهم ترین آفات بادمجان در ایران و سایر کشورها به شمار می آید. اندازه بدن ۳۰۰ تا ۵۰۰ میکرون بوده و افراد ماده درشت تر از افراد نرند. انتهای بدن در افراد نر دو کی شکل و رنگ بدن آنها فصلی است به طوری که در بهار و تابستان، سبز متمایل به زرد و با دو لکه پشتی جانبی تیره می باشد. در اواخر پاییز و زمستان فاقد لکه های پشتی و بدن نیز به رنگ قرمز دیده می شود. این کنه با ایجاد تارهای بسیار ظریف مانند تار عنکبوت روی گیاه باعث کاهش رشد آن می شود. در اثر شدت حمله کنه و تغذیه از شیرۀ گیاه، برگها زرد و قهوه ای شده و سپس می خشکند. برگ های آلوده به آفت غبار آلود به نظر می رسند. حمله آفت معمولاً از حاشیۀ مزرعه شروع شده و به تدریج توسعه می یابد.

فعالیت این آفت اغلب در پشت برگ های میزبان می باشد. جمعیت مراحل فعال و تخم این کنه در برگ های تحتانی و فوقانی بادمجان به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را داشته است. در بررسی تفاوت آلودگی ارقام مختلف بادمجان به جمعیت این کنه طی سالهای ۷۹-۸۰ در منطقه ورامین مشخص شد که ارقام بادمجان برازجان و ۹۰۵ امامی دارای بیشترین میانگین جمعیت مراحل فعال به ترتیب ۱۷۰/۹۳ و ۴۸/۸۶ کنه در بوته و ارقام بادمجان سیاه نیشابور و سرخون هرمزگان دارای کمترین میانگین جمعیت مراحل فعال به ترتیب ۳/۴ و ۳/۱ کنه در بوته بودند. بیشترین و کمترین خسارت این کنه به ترتیب روی ارقام ۹۰۵ امامی و قلمی ورامین به ترتیب ۶۹/۴۲ و ۱۲/۸۶ درصد گزارش گردیده است.

فعالیت این کنه روی بادمجان در شرایط اقلیمی ورامین در تیرماه آغاز گردیده و حداکثر جمعیت در نیمه اول مرداد و دومین اوج جمعیت با اختلاف کمتری در اوایل آبان ماه مشاهده گردید. دما نقش مؤثری در افزایش جمعیت دارد در حالیکه رطوبت اثر منفی بر روی آن می گذارد. کنترل این آفت به دو روش بیولوژیکی و شیمیایی می باشد.

الف: بیولوژیکی

مهم ترین شکارگرهای کنه تارتن دونقطه ای در ایران عبارتند از:

۱- کفشدوزک سیاه کنه خوار (*Stethorus gilvifrons*)

۲- کنه های شکارگر (*Phytoseiulus persimilis*, *Zetzellia mali*, *Amblyseius cucumeris*)

۳- بالتوری (*Chrysoperla carena*)

۴- تریپس شکارگر (*Scolothrips longieornis*)

۵- *Scymnus spp.*

ب: شیمیایی

در صورت بالا بودن تراکم جمعیت، می توان از سمومی نظیر ابامکتین امولسیون ۱/۸ درصد به میزان ۲۰ سانتی متر مکعب به اضافه یکصد لیتر آب با ۲۰۰ سانتیمتر مکعب روغن فن پایروکیسیت سوسپانسیون ۵ درصد به میزان نیم در هزار استفاده کرد. سم دانتول به عنوان یک سم کنه کش و حشره کش می تواند توصیه بسیار مناسبی جهت مبارزه هم زمان با کنه و آفات چوبی و تریپس باشد.

Leucinodes orbonalis

پروانه میوه خوار بادمجان

این آفت از سال ۱۳۷۶ در استان مازندران به طور وسیعی در روی میوه بادمجان و به طور محدود روی گوجه فرنگی خسارت وارد می کند. بادمجان، گوجه فرنگی، سیب زمینی و سیب زمینی شیرین از جمله میزبان های این آفت می باشند.

رنگ افراد بالغ سفید با نقاط صورتی و یا آبی کمرنگ می باشد. تخم ها به رنگ سفید کرم هستند که به صورت انفرادی یا گروهی در پشت برگ گیاهان میزبان قرار داده می شوند. لارو سن یک به رنگ سفید شیری است اما وقتی تغذیه آن کامل شده و به لارو بالغ تبدیل گردد رنگ آن صورتی شفاف می گردد و اندازه آن به ۱۵ تا ۱۸ میلیمتری رسد.

لارو آفت با تغذیه از سرشاخه و برگ و ایجاد تونل داخل میوه ها ایجاد خسارت می کند. لاروهای جوان آفت به شاخه و گلکهای گیاه حمله می کنند ولی لاروهای مسن تر داخل میوه ایجاد تونل می کنند. لاروها روی میوه ها سوراخ ریزی به وجود می آورند که پر از فضولات لارو می شود. هر میوه ممکن است تا ۲۰ عدد لارو داشته باشد. این آفت با تغذیه از برگ و میوه باعث ضعف گیاه و تولید میوه های غیر قابل مصرف می شود. کنترل این آفت به روش های مختلف صورت می گیرد.

الف: کنترل زراعی

۱- از بین بردن بوته های آلوده

۲- کشت گیاهان غیر میزبان و اجرای تناوب دوساله

۳- استفاده از ارقام مقاوم و دیررس

ب: کنترل مکانیکی

اگر حصار مزرعه به ارتفاع ۲/۵ متر باشد پروانه های ماده قادر به وارد شدن به داخل مزرعه نیستند چرا که این حشره بسیار تنبل است و قادر به پرواز در ارتفاع بالاتر نمی باشد.

ج: کنترل فرمونی

استفاده از فرمون برای ردیابی آفت و جمع آوری حشرات بالغ در مدیریت این آفت معمول است.

د: کنترل بیولوژیکی

زنبور *Eriborus sinicus* از دشمنان طبیعی این آفت است که به صورت پارازیتوئید داخلی عمل می کند.

ه: کنترل شیمیایی

سومیسیدین ۲۰ درصد و دسیس ۲/۸ درصد به میزان ۰/۷ تا ۱ لیتر در هکتار در کنترل آفت بسیار مؤثر بوده است. سمپاشی باید زمانی صورت گیرد که لاروهای سن یک در روی ساقه سرگردان هستند و به عبارتی تخم ها باز شده اند.

Macrosiphum eupharbiae

شته های سیب زمینی

Siphonophora solanifolii

Aphis gossypi

Aulacorthum solani

این شته ها دارای میزبان های متنوعی هستند ولی اکثراً در روی سیب زمینی، گوجه فرنگی،

بادمجان، فلفل، چغندر قند، کلم، داودی، رز و... زندگی می کند.

کلنی های انبوه این حشره اکثراً در روی شاخه ها و یا اندام های رویشی جوان گیاه میزبان تشکیل می گردد. در حملات شدید، گیاه قادر به رشد نبوده و کوتوله باقی می ماند و گاهی نیز کاملاً می خشکد. خسارت اصلی و قابل توجه این شته در انتقال بعضی از بیماری های ویروسی است که از مهم ترین آنها میتوان به ویروس موزائیک باقلا، موزائیک کلم گل، موزائیک خیار، پیچیدگی برگ سیب زمینی و ویروس A سیب زمینی اشاره کرد.

درمجموع شته ها از شیر گیاهی درون برگها و ساقه ها تغذیه می کنند. خال های دوده ای سیاه بر روی مدفوعات قندی شته ها توسعه می یابد. این خالهای دوده ای گیاه را می پوشانند و فتوسنتز را کاهش داده گیاه را ضعیف می کنند. شته ها در فصول خشک و سرد توسعه می یابند.

در مناطقی که جمعیت آفت در حد اقتصادی می باشد برای کنترل آن میتوان از سموم فسفره تماسی نفوذی نظیر مالاتیون ۵۷ درصد به میزان ۱/۵ لیتر در هکتار استفاده کرد. کاربرد گرانول های کربوفوران (۱۰۰۰ گرم ماده موثره در هکتار) در زمان نشاکاری و به دنبال آن ۲ تا ۳ بار محلول پاشی سیپرمنترین (۳۰ گرم ماد موثره در هکتار) به فواصل ۱۰ تا ۱۵ روزه برای کنترل آفت توصیه می گردد.

تریپس توتون *Thrips tabaci*

گونه ای است پلی فاژ با میزبان های متعدد شامل توتون، پنبه، کلم، گل کلم، کتان، چغندر قند، کنف، سیب زمینی، بادمجان، پیاز، خیار، خربزه، گوجه فرنگی، لوبیا، نخود، بادام زمینی، کرفس، شلغم و جعفری.

اندازه بدن حشره کامل ۰/۹ میلیمتر بوده بدن آن پهن، باریک و به رنگ زرد، قهوه ای، خاکستری روشن تا تیره دیده می شود. تخم های این آفت سفید و شفاف به طول ۰/۲۵ میلیمتر می باشد که داخل نسوج گیاه میزبان قرار داده می شود و لذا نمی توان آنها را با چشم غیر مسلح مشاهده کرد.

لارو این آفت به رنگ زرد روشن است. لاروها غالباً در پشت برگ گیاه میزبان فعال می باشند. پوره های تریپس شبیه حشرات کامل بوده و رنگ آنها زرد روشن است.

بیشترین خسارت آفت در روی جوانه های بذری داخل خاک دیده می شود. یعنی به جوانه هایی که از پوسته بذر خارج می شوند خسارت وارد می کند. همچنین لکه های نقره ای زرد و یا قهوه ای روی برگ ایجاد کرده و نهایتاً باعث بد شکلی و کوچک ماندن برگ می شود. خسارت توسط حشرات کامل، پوره و لارو تریپس می باشد. اغلب سموم حشره کش موجود در بازار علیه تریپس مؤثرند فقط می بایست به دوره کارنس سم توجه گردد. بدین لحاظ می توان از سمومی چون دی کلرووس ۵۰ درصد، سومیسیدین ۲۰ درصد، مالاتیون ۵۷ درصد، دیازینون ۶۰ درصد، هپتافوس ۵۰ درصد و تیودیکارب ۸۰ درصد به نسبت ۱/۵ تا ۲ در هزار استفاده کرد.

برداشت:

میوه بادمجان از زمانی که حدود یک سوم آن تشکیل شده است تا زمانی که اندازه نهایی خود را پیدا کرده باشد قابل برداشت است. میوه مطلوب می بایستی سفت، براق، عاری از برش یا چروکیدگی و با اندازه مناسب و بازارپسند باشد (شکل ۱۳) (چن، ۲۰۰۱ و چن و دیگران، ۲۰۰۲). میوه کاملاً رسیده را می توان تا مدت زمان نسبتاً زیادی روی بوته نگه داشت بدون آنکه تغییر محسوسی در آن ایجاد گردد. ولیکن نگهداری بیش از حد آن باعث سفتی پوست، بذری شدن و کاهش کیفیت میوه می گردد. تأخیر در برداشت ممکن است باعث جوانه زنی بذور در داخل میوه گردد (شکل ۱۴). به علاوه نگه داری میوه ها روی بوته باعث می شود که تشکیل میوه های جدید به مخاطره افتد. زمانی که به دلیل نگهداری میوه روی بوته، رنگ پوست شروع به کمرنگ شدن می کند، بذور تیره گردیده و گوشت میوه اسفنجی و تلخ میگردد (سوک پرکان و دیگران، ۲۰۰۲).

برداشت دستی ممکن است توسط چاقوی تیز یا قیچی باغبانی صورت گیرد. برداشت یک یا دو بار در هفته صورت می گیرد. بادمجان نایستی دوره پس از برداشت طولانی داشته باشد و می بایست فوراً به بازار عرضه گردد. میوه ها معمولاً بر اساس رنگ و اندازه بسته بندی می گردند. بادمجان می تواند به مدت ۷ تا ۱۰ روز در دمای ۷ تا ۱۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۹۰ تا ۹۵ درصد نگهداری گردد. ثابت شده است که سرمازدگی در دمای زیر ۷ درجه سانتیگراد باعث خسارت به بادمجان می گردد. علائم سرمازدگی عبارتند از: چروکیدگی، برنزه شدن سطح و قهوه ای شدن بذور و گوشت (چن و دیگران، ۲۰۰۲).



شکل ۱۳- میوه بادمجان آماده جهت برداشت و عرضه با بازار مصرف



شکل ۱۴- عوارض تأخیر بیش از حد در برداشت میوه بادمجان

منابع

۱. اصغری، ج. و آ، محمودی. ۱۳۷۸. علف های هرز مهم مزارع و مراتع ایران. چاپ اول. انتشارات دانشگاه گیلان، ۱۵۸ ص.
۲. اعتباریان، ح. ۱۳۸۱. بیماری های سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آنها. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران، ۵۵۴ ص.
۳. بوستانی س. و ن. ملحاوی. ۱۳۷۴. بررسی و تعیین مناسبترین تراکم بوته بادنجان رقم بلاک بیوتی. خلاصه مقالات دومین سمینار تحقیقات سبزی و صیفی. انتشارات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات سبزی و صیفی: ۷۸-۷۶.
۴. پیوست، غ. ۱۳۸۱. سبزیکاری. چاپ دوم. نشر علوم کشاورزی، ۳۸۴ ص.
۵. کالو، جی. و بی. اُ. برگ. ۱۳۷۹. اصلاح ژنتیکی سبزیهای زراعی. ترجمه یوسف عرشی. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی. ۷۲۵ ص.
۶. خانجانی، م. ۱۳۸۴. آفات سبزی و صیفی ایران. چاپ اول. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، ۴۶۷ ص.
۷. دانشور، م. ۱۳۷۹. پرورش سبزی. چاپ اول. انتشارات دانشگاه شهید چمران، ۴۶۱ ص.
۸. کازرانی ن. و ح. میوه چی لنگرودی. ۱۳۸۲. بررسی صفات کمی، کیفی و مقایسه عملکرد ارقام بادمجان قلمی در استان بوشهر. خلاصه مقالات سومین کنگره علوم باغبانی ایران: ۲۷۲-۲۷۳.
۹. معاونت وزارت جهاد کشاورزی، دفتر سبزی و صیفی. ۱۳۸۶. آشنائی با ارزش غذایی سبزی و صیفی و شاخص های زراعی آن. نشریه کشاورز، شماره ۳۳۴: ۳۸-۳۴.
۱۰. ناصری، م. و ع. تهرانی فر. ۱۳۷۸. تولید بذر سبزیجات. چاپ سوم. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۳۰۰ ص.

۱۱. مصلی نژاد ه.، م.نوروزیان و ا.محمد بیگی. ۱۳۸۱. فهرست آفات، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز مهم محصولات عمده کشاورزی کشور و سموم توصیه شده علیه آنها بر اساس توصیه های کمیته تعیین انواع سموم دفع آفات نباتی و روش کاربرد آنها. چاپ اول. انتشارات نشر آموزش کشاورزی، ۱۱۲ ص.

۱۲. وزارت جهاد کشاورزی. ۱۳۸۵. آمار منتشر نشده ۸۴-۱۳۸۳ سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی.

13. Chen, N.C. 2001. Eggplant seed production. AVRDC International Cooperators Guide. Asian Vegetable Research and Development center, Shanhua, Taiwan.
14. Chen, N.C., T. Kalb, N.S. Talekor, J.F.Wang and C.H.Ma. 2002. Suggested Cultural Practices for eggplant. In: <http://www.avrdc.org/lc/eggplant/practices.pdf>.
15. Darbie, M.G. 1990. Commercial Eggplant Production. The University of Georgia, College of Agricultural & Environmental Sciences, Cooperative Extension Service.
16. FAO. 2005. Annual Reports.
17. FAO. 2012. FAOSTAT. In: <http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx>
18. Masiunas, J.B. 2005. Weed control for Commercial Vegetable Crops. Illions Agricultural Pest Management Hand Book: 239-270.
19. Ram, H.H. 1999. Vegetable Breeding, principles and practices, Kaliani Publishers, New Dehli, India, 421p.
20. Stall, W.M. 2002. Weed Control in Eggplant. In : <http://edis.ifas.ufl.edu>.
21. Sukprkan, S., S.Juntakool and R.Huang. 2002. Saving Seeds of Eggplant. In: <http://www.avrdc.org/pdf/seeds/eggplant.pdf>.

Ministry of Jihad-e- Agriculture
Agricultural, Research, Education and Extension Organization
Seed and Plant Improvement Institute

Planting, Growing and Harvesting
Handbook of
Eggplant
(*Solanum melongena* L.)



By:
Mahmoud Bagheri

Summer 2015

Register No. : 7136.244.20